

## Etude sur le Vitiligo (VIP2)

Etude destinée aux enfants de 6 ans à <12 ans porteurs de vitiligo non segmentaire. Le traitement à l'étude est le ruxolitinib vs placebo.

Les principaux critères d'inclusion sont :

1. Zone dépigmentée sur le visage : La dépigmentation faciale doit représenter au moins 0,5 % de la surface corporelle totale ( $\geq 0,5$  F-VASI)
2. Zone dépigmentée sur le reste du corps (hors visage) : Les parties non faciales doivent être atteintes sur au moins 3 % de la surface corporelle totale ( $\geq 3$  T-VASI).
3. Étendue totale du vitiligo (visage + corps) : ne doit pas dépasser 10 % de la surface corporelle totale.

Exemple de calcul de la surface dépigmentée :

### BSA ASSESSMENT

The participant's palm plus 5 digits (palmar method), with fingers together and thumb tucked to the side (handprint) equals 1% BSA

Example 1

+ BSA ≈ 3.0% (3 handprints)

Example 2

+ BSA ≈ 0.5% (5 thumbs)

The participants' thumb is also used for smaller measurements:  
1 thumb = 0.1% BSA  
1 fingertip = 0.03% BSA

**Note:** pediatric BSA methodology is same as per adult BSA.

Merci d'adresser vos patients à :

[Lola.papinot@chu-nantes.fr](mailto:Lola.papinot@chu-nantes.fr) et [anne.lefebvre@chu-nantes.fr](mailto:anne.lefebvre@chu-nantes.fr)